

湘南藤沢レジメン											
レジメン名	略語	一般名	投与量	投与法	投与時間	投与日	1コース	催吐リスク	FNリスク	補足	共通コード
Topotecan +BV	TOP	トポテカン	1.25mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	day1-5	3週毎	低	高	PDIに至るまで	-
	BV (Bmab)	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	day1					
weeklyTC	PTX	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	day1・8・15	4週毎	低	低	6コース	-
	CBDCA	カルボプラチン	AUC2	点滴	30分	day1・8・15					
Olaparib +BV	-	オラパリブ	300mg/回	経口	1日2回	連日	3週毎	中	低	初期治療終了後BV単剤16コース	-
	BV (Bmab)	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	day1					
PLD-BV (Bmab)	PLD	リボソーマルドキソルピシン	40mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	day1	4週毎	低	低	最大PLD400~500mg/m <sup>2</sup>	-
	BV (Bmab)	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	day1					
DC+BV(Bmab)	DTX	ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	day1	3週毎	中	中	6コース	-
	CBDCA	カルボプラチン	AUC5	点滴	30分	day1					
	BV (Bmab)	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	day1					
徳洲会レジメン											

卵巣がん; 上皮性卵巣がん (Epithelial Ovarian Cancer), 胚細胞腫瘍, 絨毛癌

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与法	投与時間	投与日	1コース	催吐リスク	FNリスク	補足	共通コード
TC	PTX	パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>	点滴	3時間	day1	3週毎	中	中	6コース	756013
	CBDCA	カルボプラチン	AUC6	点滴	60分	day1					
dd-TC	PTX	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	day1・8・15	3週毎	中	低	6コース	756023
	CBDCA	カルボプラチン	AUC6	点滴	30分	day1					
TC+BV (Bmab)	PTX	パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>	点滴	3時間	day1	3週毎	中	中	6コース	756005
	CBDCA	カルボプラチン	AUC6	点滴	60分	day1					
	BV	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	day1					
維持Bevacizumab	BV (Bmab)	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	day1	3週毎	最小	低	初期治療終了後BV単剤16コース	756006
DC	DTX	ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	day1	3週毎	中	中	6コース	756033
	CBDCA	カルボプラチン	AUC5	点滴	30分	day1					
GC	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	day1・8	3週毎	中	低	6コース 最大10コース	756203
	CBDCA	カルボプラチン	AUC4	点滴	60分	day1					
	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	day1・8					
GC+BV (Bmab)	CBDCA	カルボプラチン	AUC4	点滴	60分	day1	3週毎	中	低	初期治療終了後BV単剤16コース	756002
	BV (Bmab)	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	day1					
	PLD	リボソーマルドキソルピシン	30mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	day1					
PLD+CBDCA	PLD	リボソーマルドキソルピシン	30mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	day1	4週毎	中	低	最大6コース	756001
	CBDCA	カルボプラチン	AUC5	点滴	60分	day1					

CDDP+CPT-11	CDDP	シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	day1	4週毎	高	中	3-6コース	756053
	CPT-11	イリノテカン	60mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	day1・8・15					

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与法	投与時間	投与日	1コース	補足	FNリスク	補足	共通コード
GEM	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	day1・8・15	4週毎	低	低	PDに至るまで	756183
PLD	PLD	リボソーマルドキソルピシン	50mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	day1	4週毎	低	低	最大PLD400 ~500mg/m <sup>2</sup>	756113
Topotecan	TOP	トポテカン	1.5mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	day1-5	3週毎	低	高	PDに至るまで	756193
CPT-11	CPT-11	イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	day1・8・15	4週毎	中	高	PDに至るまで	756103
weeklyPTX	PTX	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	day1・8・15	4週毎	低	低	PDに至るまで	756073
DOC	DOC	ドセタキセル	70mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	day1	3週毎	低	高	PDに至るまで	756083

#### 胚細胞腫瘍

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与法	投与時間	投与日	1コース	補足	FNリスク	補足	共通コード
BEP	BLM	ブレオマイシン	30mg/body	急速静注	3分	day2・9・16	3週毎	高	高	3-4コース	756133
	VP-16	エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	day1-5					
	CDDP	CDDP	20mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	day1-5					

#### 絨毛癌

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与法	投与時間	投与日	1コース	補足	FNリスク	補足	共通コード
MTX	MTX	メトレキサート	20mg./body	筋注	—	day1-5	14日	低	—	HCG-β 正常化まで	756143
EMA	VP-16	エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	day1・2	14日	高	—	HCG-β 正常化まで	756153
	MTX	メトレキサート	300mg/m <sup>2</sup>	点滴	12時間	day1					
	LV	ロイコボリン	15mg/body	経口	12時間毎	day2-3					
	Act-D	アクチノマイシンD	0.5mg/body	急速静注	—	day1・2					
EMA/CO	VP-16	エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	day1・2	14日	高	—	HCG-β 正常化まで	756163
	MTX	メトレキサート	300mg/m <sup>2</sup>	点滴	12時間	day1					
	LV	ロイコボリン	15mg/body	経口	12時間毎	day2-3					
	Act-D	アクチノマイシンD	0.5mg/body	急速静注	—	day1・2					
	CPA	シクロホスファミド	600mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	day8					
	VCR	ビンクリスチン	0.8mg/m <sup>2</sup>	急速静注	—	day8					