

脳腫瘍 (Central Nervous System Tumors)

湘南藤沢レジメン												
レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース	催吐リスク	FNリスク	補足	共通コード	
テモダール®	TMZ	テモゾロミド	150~200mg/m ² /回	経口	1日1回	day1-5	4週毎	中	低	維持療法	-	
			150~200mg/m ²	点滴	90分	day1-5	4週毎			再発、内服困難な症例		
TMZ+RTx	TMZ	テモゾロミド	◎75mg/m ² /回	経口	1日1回	day1-42(RTx が中断の場合最大49日まで延長可能)	10週間 * 1コース	中	低	初発	-	
			◎150~200mg/m ² /回	点滴	90分	day1-5	4週毎 * 6コース			再発、内服困難な症例		
			◎75mg/m ² /回							day1-42(RTx が中断の場合最大49日まで延長可能)		10週間 * 1コース
			◎150~200mg/m ² /回							day1-5		4週毎 * 6コース
TMZ+Bevacizumab+RTx	TMZ	テモゾロミド	◎75mg/m ² /回	経口	1日1回	day1-42(RTx が中断の場合最大49日まで延長可能)	10週	中	低	化学放射線療法→維持→Bv単剤	-	
			◎150~200mg/m ² /回				day1-5					4週毎 * 6コース
TMZ+Bevacizumab+RTx	BV	ベバシズマブ	◎10mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	①day1,15,29,42 ②day1,15 ③day1	①10週間 * 1コース	中	低	化学放射線療法→維持→Bv単剤	-	
			◎15mg/kg				②4週間 * 6コース					
Bevacizumab	BEV	ベバシズマブ	10mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	day1	2週毎	-	-	再発	-	

徳洲会レジメン

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース	催吐リスク	FNリスク	補足	共通コード
TMZ+Bevacizumab	TMZ	テモゾロミド	150~200mg/m ² /回	経口	1日2回	day1-5	4週毎				
			10mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	day1・15	2週毎				
アバチン®	BEV	ベバシズマブ	10mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	day1・15	2週毎			再発	
			15mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	day1・15	3週毎				