

## 胆道がん (Biliary Tract Cancer)

・day1=1日目、day1-14=初日から連続して14日間(入院中は1日2回の場合、1日目夕から15日目朝まで服用)

徳洲会レジメン											
レジメン名	略語	一般名	投与量	投与法	投与時間	投与日	1コース	催吐リスク	FNリスク	補足	共通コード
GS	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	day1,8	3週毎	低	低	進行再発	722001
	S-1	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m <sup>2</sup>	経口	1日2回	day1-14					
GEM	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	day1,8,15	4週毎	低	低	進行再発 1st-2nd line	722013
GC	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	day1,8	3週毎	中	中	進行再発	722033
	CDDP	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	day1,8					
GC+Durvalumab 最大8コース後維持療法へ	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	day1,8	3週毎	中	低	進行再発	722002
	GEM	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	day1,8					
	Durvalumab	デュルバルマブ(イフィンジ)	1500mg/body	点滴	60分	day1	8コースまで				
維持Durvalumab	Durvalumab	デュルバルマブ(イフィンジ)	1500mg/body	点滴	60分	day1	4週毎	低	低		