

膵がん (Pancreatic Cancer)

・day1=1日目、day1-14=初日から連続して14日間(入院中は1日2回の場合、1日目夕から15日目朝まで服用)

湘南藤沢レジメン

| レジメン名 | 略語  | 一般名              | 投与量                   | 投与方法 | 投与時間 | 投与日     | 1コース | 催吐リスク | FNリスク | 補足   | 共通コード |
|-------|-----|------------------|-----------------------|------|------|---------|------|-------|-------|------|-------|
| GS    | GEM | ゲムシタビン           | 1000mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 30分  | day1,8  | 3週毎  | 低     | 低     | 進行再発 | -     |
|       | S-1 | テガフル・ギメラシル・オテラシル | 80mg/m <sup>2</sup>   | 経口   | 1日2回 | day1-14 |      |       |       |      |       |

徳洲会レジメン

|                  |              |                |                       |                       |      |           |     |   |   |  |        |
|------------------|--------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------|-----|---|---|--|--------|
| FOLFIRINOX       | L-OHP        | オキサリプラチン       | 85mg/m <sup>2</sup>   | 点滴                    | 2時間  | day1      | 2週毎 | 中 | 中 | 進行再発<br>UGT1A1*6/*6、UGT1A1*28/*28、<br>UGT1A1*6/*28接合体を有する場合慎重投<br>※CPT-11を150mg/m <sup>2</sup> へ減量、5-FU bolusをカットしたmodifiedレジメンがある   | 725005 |
|                  | I-LV         | レボホリナート        | 200mg/m <sup>2</sup>  | 点滴                    | 2時間  |           |     |   |   |  |        |
|                  | CPT-11       | イリノテカン         | 180mg/m <sup>2</sup>  | 点滴                    | 90分  |           |     |   |   |  |        |
|                  | 5-FU(bolus)  | フルオロウラシル       | 400mg/m <sup>2</sup>  | 点滴                    | 3分   |           |     |   |   |  |        |
|                  | 5-FU(c.i.v.) | フルオロウラシル       | 2400mg/m <sup>2</sup> | 点滴                    | 46時間 | day1-3    |     |   |   |  |        |
| GEM              | GEM          | ゲムシタビン         | 1000mg/m <sup>2</sup> | 点滴                    | 30分  | day1,8,15 | 4週毎 | 低 | 低 | 進行再発   | 725013 |
| GEM              | GEM          | ゲムシタビン         | 1000mg/m <sup>2</sup> | 点滴                    | 30分  | day1,8,15 | 4週毎 | 低 | 低 | 術後補助の場合6コース(術後6週以内に開始)   | 725012 |
| GEM+nab-PAC      | GEM          | ゲムシタビン         | 1000mg/m <sup>2</sup> | 点滴                    | 30分  | day1,8,15 | 4週毎 | 低 | 低 | 進行再発   | 725006 |
|                  | nab-PAC      | アルブミン懸濁型パクリタキセ | 125mg/m <sup>2</sup>  | 点滴                    | 30分  |           |     |   |   |  |        |
| Nal-IRI+5FU/I-LV | Nal-IRI      | リボソームイリノテカン    | 70mg/m <sup>2</sup>   | 点滴                    | 90分  | day1      | 2週毎 | 中 | 中 | 進行再発、2次治療以降<br>UGT1A1*6/*6、UGT1A1*28/*28、UGT1A1*6/*28接合体を有する場合開始用量は50mg/m <sup>2</sup> とし、忍容性良好な場合次コース以降70mg/m <sup>2</sup> とすることを考慮 | 725009 |
|                  | I-LV         | レボホリナート        | 200mg/m <sup>2</sup>  | 点滴                    | 2時間  | day1      |     |   |   |  |        |
|                  |              | 5-FU(c.i.v.)   | フルオロウラシル              | 2400mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 46時間      |     |   |   |  |        |
| GEM+Erlotinib    | GEM          | ゲムシタビン         | 1000mg/m <sup>2</sup> | 点滴                    | 30分  | day1,8,15 | 4週毎 | 低 | 低 | 進行再発<br>食事の1時間以上前または食事の2時間以上後に内服   | 725003 |
|                  | Erlotinib    | エルロチニブ         | 100mg/日               | 経口                    | 1日1回 | 連日        |     |   |   |  |        |