

腎細胞がん (Renal Cell Carcinoma)

- day1=1日目、day1-14=初日から連続して14日間(入院中は1日2回の場合、1日目夕から15日目朝まで服用)

徳洲会レジメン											
レジメン名	略語	一般名	投与量	投与法	投与時間	投与日	1コース	催吐リスク	FNリスク	補足	共通コード
Temsirolimus	TEM	テムシロリムス	25mg/body	点滴	30分	day1	1週毎	最小	低		764002
Nivolumab	Nivo	ニボルマブ	240mg/body	点滴	30分	day1	2週毎	最小	低		764005
			480mg/body	点滴	30分	day1	4週毎				
Nivolumab+Ipilimumab	Nivo.	ニボルマブ	240mg/body	点滴	30分	day1	3週毎	最小	低	IDMC分類中等度～不良 Ipilimumab併用4コース	764006
	Ipi.	イピリムマブ	1mg/kg	点滴	30分	day1					
Pembrolizumab+Axitinib	Pembro.	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	30分	day1	3週毎	最小	低	Pembrolizumab:400mg/body:6週毎も選択出来 Axitinib:10mg/bodyから開始。2週間連続投与し 忍容性が認められれば 14mg/body,20mg/body へ段階的に増量可	764008
	-	アキシチニブ	20mg/body	経口	1日2回	連日					
Avelumab+Axitinib	Avelumab	アベルマブ	10mg/kg	点滴	60分	day1	2週毎	最小	低	Axitinib:10mg/bodyから開始。2週間連続投与し 忍容性が認められれば 14mg/body,20mg/body へ段階的に増量可	764007
	-	アキシチニブ	20mg/body	経口	1日2回	連日					
Pembrolizumab+Lenvatin	Pembro	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	30分	day1	3週毎	低	低	Pembrolizumab:400mg/body:6週毎も選択出来 ズ	764010
-	レンバチニブ	20mg/body	経口	1日1回	連日						
術後 3w Pembrolizumab	Pembro	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	30分	day1	3週毎	最小	低	術後1年(17コース)	764011
術後 6w Pembrolizumab	Pembro	ペムブロリズマブ	400mg/body	点滴	30分	day1	6週毎	最小	低	術後1年	764012